

Info-médication

Nom commercial : Méllaril

EFFETS THÉRAPEUTIQUES

Médecine générale : anxiété, tension, état moitié d'anxiété et de dépression, et troubles du sommeil.

Gériatrie : état confusionnels et d'agitation sénile, anxiété et état mixte d'anxiété et de dépression, insomnie.

Pédiatrie : anxiété, tension, difficultés de concentration, troubles du sommeil et troubles de comportement tels qu'agitation, hyperactivité ou agressivité.

Psychiatrie : symptômes multiples caractérisant les affections mentales, anxiété, tension, agitation, humeur dépressive et les troubles du sommeil.

Le Méllaril est particulièrement utile chez les psychotiques chroniques, chez les personnes âgées souffrant d'agitation, d'anxiété, chez les alcooliques en période de sevrage afin de soulager des symptômes tels qu'anxiété, agitation, hostilité ou hallucinations, chez les enfants qui présentent des troubles graves de comportement.

CONTRE-INDICATIONS

Chez les patients qui ont des antécédents d' hypersensibilité aux phénothiazines et chez les personnes qui présentent une dépression grave du système nerveux central ou des états comateux de toute origine, une maladie cardio-vasculaire grave.

La prudence est de rigueur chez les patients atteints de glaucome à angle fermé, hypertrophie de la prostate ou d'une maladie cardio-vasculaire, l'hypertension. En présence de maladie de foie, la surveillance périodique de la formation hépatique est de rigueur.

INTERACTION MÉDICAMENTEUSE

Il arrive que le Méllaril augmente les effets dépresseurs sur le système nerveux central. L'utilisation concomitante du lithium peut aggraver les symptômes extrapyramidaux et la neurotoxicité attribuables aux neuroleptiques.

EFFETS INDÉSIRABLES QUI PEUVENT ÊTRE ENVISAGÉS

Somnolence, sédation, confusion nocturne, hyperactivité, léthargie, vertiges et céphalées, risques de dyskinésie en cours de traitement ou à la fin, risques plus élevés à fortes doses et chez les femmes, sécheresse de la bouche, irritation gessique, nausées, constipation ou diarrhée, modification de la libido, variations de poids, œdème, trouble de l'érection et de l'éjaculation, troubles urinaires, réactions cutanées.

POSOLOGIE

De 30 à 800 mg/jour divisé entre 2 et 4 prises journalières :

- 30 à 75 m = troubles d'intensité légère
- 50 à 200 mg = troubles d'intensité modérée
- 150 à 400 = en traitement ambulatoire
- 200 à 800 = intensité grave en milieu hospitalier.

Il est **fortement** déconseillé de cesser brusquement de prendre du Méllaril. Si vous voulez cesser l'utilisation, consultez votre médecin.

Source : Tiré du Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques 1997